

		1病日	8病日	21病日
休薬完了	休薬完了			休薬完了
文書作成	文書	休薬完了21日目	アルコール過敏症確認	
		がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書		
		外 110 乳癌 Halaven アルコール過敏症確認		
注射	抗がん剤	実施確認：未 点滴末梢 メイン グラニセトロン点滴静注バッグ3mg 1袋 デキサメタゾン注射液3. 3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 204ml/h 注入時間 30分 ---①	実施確認：未 点滴末梢 メイン グラニセトロン点滴静注バッグ3mg 1袋 デキサメタゾン注射液3. 3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 204ml/h 注入時間 30分 ---①	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 エリブリン静注 1.4mg/m ² 1日1回 ★アルコール過敏症確認★ 注入時間 5分 ---②	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 エリブリン静注 1.4mg/m ² 1日1回 ★アルコール過敏症確認★ 注入時間 5分 ---②	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 ★フラッシュ用 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ---③	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 ★フラッシュ用 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ---③	
	一般注射			

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなることがあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなることがあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。