

		1病日	3病日	14病日
休薬完了	休薬完了			休薬完了
文書作成	文書	<p>休薬完了14日目</p> <p>外 113 大腸癌 FOLFIRI/P-mab がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書</p>		
注射	抗がん剤	<p>実施確認：未 ワンショット中心静脈 補助1側管1 大塚生食注 20mL 1A 1日1回 ポート針、刺入時間確認 ---①</p>		
		<p>実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 ---② ルート確保用 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ★パル輸液セット使用★</p>		
		<p>実施確認：未 点滴中心静脈 メイン 側管1 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 5mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 3A 1日1回 点滴速度 216ml/h 注入時間 30分 ---③ ルートは後でレボホリナート投与に使用</p>		
		<p>実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 パニツムマブ点滴静注 6mg/kg 1日1回 ★パル輸液セット使用★ ★投与終了後、1時間は観察十分に… 注入時間 1時間 ---④</p>		
		<p>実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 イリノテカン点滴静注 150mg/m² 1日1回 注入時間 2時間 レボホリナートと同時に投与 ---⑤</p>		
		<p>実施確認：未 点滴中心静脈 メイン 側管1 大塚生食注 250mL 1袋 レボホリナート点滴静注用 200mg/m² 1日1回 注入時間 2時間 イリノテカンと同時に投与 ---⑥</p>		
		<p>実施確認：未 点滴中心静脈 メイン 側管1 大塚生食注 50mL 1瓶 フルオロウラシル注 400mg/m² 1日1回 注入時間 5分 急速投与 ---⑦</p>		
		<p>実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚生食注 20mL 20mL フルオロウラシル注 2400mg/m² 1日1回 注入時間 46時間 ---⑧ インフューザーポンプ ★7材の投与量別希釈表参照★</p>		
	携帯ポンプ			
	一般注射		ワンショット中心静脈 補助1側管1 大塚生食注 20mL 1A	
処方	処方	ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg 2錠 1日2回 朝・夕食後 14日分	⇒	⇒
		ヘパリン類似物質油性クリーム0.3% 25g 2本 ぬり薬 1日2回 部位：体		
		ヒドロコルチゾン酪酸エステル クリーム0.1% 5g 2本 ぬり薬 1日2回 部位：顔		
		ジフルプレドナート軟膏0.05% 5g 2本 ぬり薬 1日2回 部位：体・手足		
		ミノサイクリンは6週間服用		

副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなるがあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなるがあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅でも過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- 皮膚乾燥 …… 治療が進むにつれて乾燥と掻痒感が強くなる可能性があるため、開始と同時に保湿剤を使用して保湿を開始する。(パニツムマブ)
- にきび様皮疹 …… 顔や前胸部などに皮疹が出現するので、出現時には部位に応じたステロイド軟膏を保湿剤を塗布した上から塗布する。(パニツムマブ)
- 電解質異常 …… 血液中のマグネシウム低下に伴って、動悸などが発現する可能性がある。(パニツムマブ)