

		1病日	21病日
休薬完了	休薬完了		休薬完了
文書作成	文書	休薬完了21日目	
		外 122 乳癌 PER/HER(3W) 2回目以降	
		がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書	
注射	抗がん剤	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 204ml/h 注入時間 30分 ---①	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 ペルツズマブ点滴静注 420mg 1日1回 注入時間 1時間 ---②	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 トラスツズマブ注射用 6mg/kg 1日1回 注入時間 1時間30分 ★前回異常がなければ、60分に短縮可 ---③	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 ---④	
	一般注射		

□副作用への対応

発熱、悪寒(インフルエンザリアクション)……点滴中～投与後24時間以内に発現する。(トラスツズマブ、ペルツズマブ)

心機能低下 ……………繰り返し点滴することにより労作時の呼吸困難、下肢浮腫、急激な体重増加などの症状が現れることがあるため、定期的に心エコー検査などを行う。(トラスツズマブ、ペルツズマブ)