

		1病日	8病日	15病日	21病日
休薬完了	休薬完了				休薬完了
文書作成	文書	休薬完了21日目			
		外 124 乳癌 PER/HERBS/PAC 2回目以降			
		がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書 アルコール過敏症確認			
前投薬	内服前投薬	レスタミンコーワ5錠	レスタミンコーワ5錠	レスタミンコーワ5錠	
注射	抗がん剤	実施確認：未 点滴末梢 メイン グラニセトロン点滴静注バッグ3mg 1袋 ファモチジン注射液2.0mg 2mL 1A デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 208ml/h 注入時間 30分 ---① ↓ ★バル輸液セット使用★ ★ジフェンヒドラミン内服確認★	実施確認：未 点滴末梢 メイン グラニセトロン点滴静注バッグ3mg 1袋 ファモチジン注射液2.0mg 2mL 1A デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 208ml/h 注入時間 30分 ---① ↓ ★バル輸液セット使用★ ★ジフェンヒドラミン内服確認★	実施確認：未 点滴末梢 メイン グラニセトロン点滴静注バッグ3mg 1袋 ファモチジン注射液2.0mg 2mL 1A デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 208ml/h 注入時間 30分 ---① ↓ ★バル輸液セット使用★ ★ジフェンヒドラミン内服確認★	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 パクリタキセル注 80mg/m <sup>2</sup> 1日1回 ★バル輸液セット使用★ 注入時間 1時間 ---②	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 パクリタキセル注 80mg/m <sup>2</sup> 1日1回 ★バル輸液セット使用★ 注入時間 1時間 ---②	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 パクリタキセル注 80mg/m <sup>2</sup> 1日1回 ★バル輸液セット使用★ 注入時間 1時間 ---②	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 ベルツズマブ点滴静注 420mg 1日1回 注入時間 1時間 ---③	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ---③	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ---③	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 トラスツズマブBS注 6mg/kg 注射用水PL「フソー」 20mL 1A 1日1回 注入時間 1時間30分 ★前回異常がなければ、60分に短縮可 ---④			
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ---⑤			
処方	処方	ジフェンヒドラミン錠10mg 5錠 血管確保前に服用	ジフェンヒドラミン錠10mg 5錠 血管確保前に服用	ジフェンヒドラミン錠10mg 5錠 血管確保前に服用	

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅でも過ごす時も手洗いうがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- 発熱、悪寒(インフルエンザリアクション) …… 点滴中～投与後24時間以内に発現する。(トラスツズマブ、ベルツズマブ)
- 心機能低下 …… 繰り返し点滴することにより労作時の呼吸困難、下肢浮腫、急激な体重増加などの症状が現れることがあるため、定期的に心エコー検査などを行う。(トラスツズマブ、ベルツズマブ)
- 末梢神経障害 …… 治療を繰り返すことによって手足がしびれることがある。(パクリタキセル)
- 関節痛・筋肉痛 …… 点滴後、関節痛や筋肉痛を感じることもある。痛みが強い場合は鎮痛剤を使うこともある。(パクリタキセル)