

		1病日	2病日	3病日	14病日
休業完了	休業完了				休業完了
文書作成	文書	<p>休業完了14日目</p> <p>外 127 膵臓癌 FOLFIRINOX</p> <p>がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書</p>			
注射	抗がん剤	<p>実施確認：未</p> <p>ワンシヨット中心静脈 補助1側管1</p> <p>大塚生食注 20mL 1A</p> <p>1日1回</p> <p>ポート針、刺入時間通確認!</p> <p>---①</p>			
		<p>実施確認：未</p> <p>中心静脈 メイン</p> <p>大塚生食注 100mL 1瓶</p> <p>1日1回</p> <p>ルート確保用</p> <p>---②</p>			
		<p>実施確認：未</p> <p>点滴中心静脈 メイン 側管1</p> <p>大塚生食注 100mL 1瓶</p> <p>パロメセトロン静注0.75mg 5mL 1瓶</p> <p>デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 3A</p> <p>1日1回</p> <p>点滴速度 216ml/h</p> <p>注入時間 30分</p> <p>---③</p> <p>ルートは後でレボホリナート投与に使用</p> <p>★アプレピタント(125mg)服用確認</p>			
		<p>実施確認：未</p> <p>中心静脈 メイン</p> <p>大塚糖液5%250mL 1袋</p> <p>オキサリプラチン注 85mg/m<sup>2</sup></p> <p>1日1回</p> <p>---④</p> <p>注入時間 2時間</p>			
		<p>実施確認：未</p> <p>中心静脈 メイン</p> <p>大塚生食注 250mL 1袋</p> <p>イリノテカン点滴静注 180mg/m<sup>2</sup></p> <p>1日1回</p> <p>注入時間 2時間</p> <p>★レボホリナートと同時に投与</p> <p>---⑤</p>			
		<p>実施確認：未</p> <p>点滴中心静脈 メイン 側管1</p> <p>大塚生食注 250mL 1袋</p> <p>レボホリナート点滴静注用 200mg/m<sup>2</sup></p> <p>1日1回</p> <p>注入時間 2時間</p> <p>★イリノテカンと同時に投与</p> <p>---⑥</p>			
		<p>実施確認：未</p> <p>点滴中心静脈 メイン 側管1</p> <p>大塚生食注 50mL 1瓶</p> <p>フルオロウラシル注 400mg/m<sup>2</sup></p> <p>1日1回</p> <p>注入時間 5分</p> <p>急速投与</p> <p>---⑦</p>			
		<p>実施確認：未</p> <p>中心静脈 メイン</p> <p>大塚生食注 50mL 50mL</p> <p>フルオロウラシル注 2400mg/m<sup>2</sup></p> <p>1日1回</p> <p>注入時間 46時間</p> <p>---⑧ インフューザーポンプ</p> <p>★7/4の7/4投与量別希釈表参照★</p>			
	携帯ポンプ				
	一般注射			ワンシヨット中心静脈 補助1側管1	
				大塚生食注 20mL 1A	
処方	処方		デキサメタゾン錠4mg 2錠	⇒	
			1日2回 朝食後、16時 3日分		
			抗がん剤翌日より内服		
		アプレピタントカプセルセット 1セット			
		1日1回、1回1CP(3日間)			
		1日目、125mgを使用			
		2日目以降、80mgを午前中に服用			

副作用への対応

悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。

便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。

下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。

口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。

好中球減少 …… 感染症予防のために外出だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。

脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。

末梢神経障害 …… 冷感刺激を避けること(特に点滴後5日間程度)。治療を繰り返すことによって手足がしびれることがある。痛みを伴う場合は痛み止めを使うことがある。(オキサリプラチン)

アレルギー反応 …… 治療を繰り返すことによってアレルギー反応を起こすことがある。(オキサリプラチン)