

		1病日	8病日	15病日	28病日
休薬完了	休薬完了				休薬完了
文書作成	文書	休薬完了28日目			
		外 131 腫瘍癌 nab-PTX/GEM			
		がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書			
		アルブミン製剤(血液製剤)			
注射	抗がん剤	実施確認：未 点滴末梢 メイン グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL 1袋 ファモチジン注射液 20mg 2mL 1A デキサメタゾン注射液 3.3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 208ml/h 注入時間 30分 ---①	実施確認：未 点滴末梢 メイン グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL 1袋 ファモチジン注射液 20mg 2mL 1A デキサメタゾン注射液 3.3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 208ml/h 注入時間 30分 ---①	実施確認：未 点滴末梢 メイン グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL 1袋 ファモチジン注射液 20mg 2mL 1A デキサメタゾン注射液 3.3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 208ml/h 注入時間 30分 ---①	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 100mL nab-パクリタキセル点滴静注用 125mg/m ² 1日1回 注入時間 30分 ★全量 () ml★ ★7L7 ^シ 製剤 泡立ちやすいので注意★ ---② 1V20mlで溶解・・・5mg/ml 生食空容器に充填すること	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 100mL nab-パクリタキセル点滴静注用 125mg/m ² 1日1回 注入時間 30分 ★全量 () ml★ ★7L7 ^シ 製剤 泡立ちやすいので注意★ ---② 1V20mlで溶解・・・5mg/ml 生食空容器に充填すること	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 100mL nab-パクリタキセル点滴静注用 125mg/m ² 1日1回 注入時間 30分 ★全量 () ml★ ★7L7 ^シ 製剤 泡立ちやすいので注意★ ---② 1V20mlで溶解・・・5mg/ml 生食空容器に充填すること	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚糖液 5% 100mL 1瓶 ゲムンタピン点滴静注用 1000mg/m ² 1日1回 注入時間 30分 ★投与側の腕を温める ---③	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚糖液 5% 100mL 1瓶 ゲムンタピン点滴静注用 1000mg/m ² 1日1回 注入時間 30分 ★投与側の腕を温める ---③	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚糖液 5% 100mL 1瓶 ゲムンタピン点滴静注用 1000mg/m ² 1日1回 注入時間 30分 ★投与側の腕を温める ---③	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 ---④	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 ---④	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 ---④	
	一般注射				

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …………… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …………… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …………… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …………… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅でも過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。
- 脱毛 …………… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- 末梢神経障害 …………… 治療を繰り返すことによって手足がしびれることがある。(nab-パクリタキセル)
- 関節痛・筋肉痛 …………… 点滴後、関節痛や筋肉痛を感じることもある。痛みが強い場合は鎮痛剤を使うこともある。(nab-パクリタキセル)