

| | | 1病日 | 3病日 | 14病日 |
|------|-------|---|------------------------------------|------|
| 休業完了 | 休業完了 | | | 休業完了 |
| 文書作成 | 文書 | 休業完了14日目 | | |
| | | 外 146 大腸癌 RAM/FOLFIRI がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書 | | |
| 注射 | 抗がん剤 | 実施確認：未 ワンショット中心静脈 補助1側管1 大塚生食注 20mL 1A 1日1回 ポート針、刺入時間通確認 ---① | | |
| | | 実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 ---② ルート確保用 ★バル輸液セット使用★ | | |
| | | 実施確認：未 点滴中心静脈 メイン 側管1 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 5mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 3A 1日1回 点滴速度 216ml/h 注入時間 30分 ---③ ルートは後でレボホリナート投与に使用 ★ジフェンヒドラミン・アプレビタント内服確認★ | | |
| | | 実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 ラムシルマブ点滴静注 8mg/kg 1日1回 ★全量250mlに合わせる★ ★バル輸液セット使用★ 点滴速度 250ml/h 注入時間 1時間 ---④ | | |
| | | 実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 イリノテカン点滴静注 150mg/m ² 1日1回 注入時間 2時間 レボホリナートと同時に投与 ---⑤ | | |
| | | 実施確認：未 点滴中心静脈 メイン 側管1 大塚生食注 250mL 1袋 レボホリナート点滴静注 200mg/m ² 1日1回 注入時間 2時間 イリノテカンと同時に投与 ---⑥ | | |
| | | 実施確認：未 点滴中心静脈 メイン 側管1 大塚生食注 50mL 1瓶 フルオロウラシル注 400mg/m ² 1日1回 注入時間 5分 急速投与 ---⑦ | | |
| | | 実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚生食注 20mL 20mL フルオロウラシル注 2400mg/m ² 1日1回 注入時間 46時間 ---⑧ インフューザーポンプ ★7材の注射投与量別希釈表参照★ | | |
| | 携帯ポンプ | | | |
| | 一般注射 | | ワンショット中心静脈 補助1側管1 大塚生食注 20mL 1A | |
| 処方 | 処方 | ジフェンヒドラミン錠 10mg 5錠 1日1回 1日分 | | |
| | | アプレビタントカプセルセット 1セット 1日1回、1回1錠 1日目、125mgを使用 2日目以降、80mgを午前中に服用 | | |
| | | ジフェンヒドラミン・アプレビタント内服 | | |

□副作用への対応
 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
 便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
 下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅でも手洗い・うがいを頻回に行う。
 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
 高血圧 …… 血圧が上昇する可能性があるため家庭血圧を記録する。(ラムシルマブ)
 タンパク尿 …… 定期的に尿検査を行う。(ラムシルマブ)
 鼻血 …… 強く鼻をかんだり触ったりしない。鼻血はほとんどの場合は軽度で、安静にしていれば止まる。(ラムシルマブ)