

		1病日	15病日	28病日
休薬完了	休薬完了			休薬完了
文書作成	文書	休薬完了28日目		
		外 147 大腸癌 Bev/TAS102		
		がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書		
注射	抗がん剤	実施確認：未 持続末梢メイポ <sup>®</sup> ソ <sup>®</sup> 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 ---①	実施確認：未 持続末梢メイポ <sup>®</sup> ソ <sup>®</sup> 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 ---①	
		実施確認：未 持続末梢メイポ <sup>®</sup> ソ <sup>®</sup> 大塚生食注 100mL 1瓶 ペバシズマブ点滴静注用 5mg/kg 1日1回 注入時間 1時間30分 ★初回90分、2回目60分、 それ以降30分に変更可能 ---②	実施確認：未 持続末梢メイポ <sup>®</sup> ソ <sup>®</sup> 大塚生食注 100mL 1瓶 ペバシズマブ点滴静注用 5mg/kg 1日1回 注入時間 1時間30分 ★初回90分、2回目60分、 それ以降30分に変更可能 ---②	
		実施確認：未 持続末梢メイポ <sup>®</sup> ソ <sup>®</sup> 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 ---③	実施確認：未 持続末梢メイポ <sup>®</sup> ソ <sup>®</sup> 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 ---③	
	一般注射			
処方	処方	TAS102 1回35mg/m <sup>2</sup> 1日2回 day1-5、day8-12 処方		

副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …………… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …………… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …………… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …………… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅でも手洗いうがいを頻回に行う。
- 脱毛 …………… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- 高血圧 …………… 血圧が上昇する可能性があるため家庭血圧を記録する。(ペバシズマブ)
- タンパク尿 …………… 定期的に尿検査を行う。(ペバシズマブ)
- 鼻血 …………… 強く鼻をかんだり触ったりしない。鼻血はほとんどの場合は軽度で、安静にしていれば止まる。(ペバシズマブ)