

		1病日	15病日	29病日	42病日
休薬完了	休薬完了				休薬完了
文書作成	文書	☑ 休薬完了42日目		☑ S-1休薬	
		外 149 大腸癌 S-1+Bev			
		がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書			
		☑ S-1:28日分 体表面積にて処方			
注射	抗がん剤	実施確認：未 持続末梢メイボ [®] ソフ [®] 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 血管確保用 ---①	実施確認：未 持続末梢メイボ [®] ソフ [®] 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 血管確保用 ---①	実施確認：未 持続末梢メイボ [®] ソフ [®] 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 血管確保用 ---①	
		実施確認：未 持続末梢メイボ [®] ソフ [®] 大塚生食注 100mL 1瓶 ペバシズマブ点滴静注用 5mg/kg 1日1回 注入時間 1時間30分 ★初回90分、2回目60分、 それ以降30分に変更可能 ---②	実施確認：未 持続末梢メイボ [®] ソフ [®] 大塚生食注 100mL 1瓶 ペバシズマブ点滴静注用 5mg/kg 1日1回 注入時間 1時間30分 ★初回90分、2回目60分、 それ以降30分に変更可能 ---②	実施確認：未 持続末梢メイボ [®] ソフ [®] 大塚生食注 100mL 1瓶 ペバシズマブ点滴静注用 5mg/kg 1日1回 注入時間 1時間30分 ★初回90分、2回目60分、 それ以降30分に変更可能 ---②	
		実施確認：未 持続末梢メイボ [®] ソフ [®] 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 フラッシュ用 ---③	実施確認：未 持続末梢メイボ [®] ソフ [®] 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 フラッシュ用 ---③	実施確認：未 持続末梢メイボ [®] ソフ [®] 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 フラッシュ用 ---③	
	一般注射				
処方	処方	☑ S-1処方 (2回/日) day1-28 1.25㎡未満 : 40mg/回 1.25㎡ ~ 1.5㎡ : 50mg/回 1.5㎡以上 : 60mg/回			

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- 高血圧 …… 血圧が上昇する可能性があるため家庭血圧を記録する。(ペバシズマブ)
- タンパク尿 …… 定期的に尿検査を行う。(ペバシズマブ)
- 鼻血 …… 強く鼻をかんだり触ったりしない。鼻血はほとんどの場合は軽度で、安静にしていれば止まる。(ペバシズマブ)
- 流涙 …… 防腐剤を含まない人工涙液を5~6回/日点眼する。(S-1)
- 手足症候群 …… 予防のために保湿剤を1日2回以上塗布。市販のハンドクリームや保湿剤でも可。(S-1)