

		1病日	15病日	22病日	28病日	
休薬完了	休薬完了				休薬完了	
文書作成	文書	☑ 休薬完了28日目		☑ テガフル・ウラシル/ホリナートカルシウム休薬		
		外 150 大腸癌 UFT/LV+Bev				
		がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書				
		☑ テガフル・ウラシル/ホリナートカルシウム:21日分				
注射	抗がん剤	実施確認：未 持続末梢メインポンプ 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 血管確保用 ---①	実施確認：未 持続末梢メインポンプ 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 血管確保用 ---①			
		実施確認：未 持続末梢メインポンプ 大塚生食注 100mL 1瓶 ペバシズマブ点滴静注用 5mg/kg 1日1回 注入時間 1時間30分 ★初回90分、2回目60分、 それ以降30分に変更可能 ---②	実施確認：未 持続末梢メインポンプ 大塚生食注 100mL 1瓶 ペバシズマブ点滴静注用 5mg/kg 1日1回 注入時間 1時間30分 ★初回90分、2回目60分、 それ以降30分に変更可能 ---②			
		実施確認：未 持続末梢メインポンプ 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 フラッシュ用 ---③	実施確認：未 持続末梢メインポンプ 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 フラッシュ用 ---③			
	一般注射					
	処方	処方	☑ テガフル・ウラシル 300mg/m <sup>2</sup> day1-21 ホリナートカルシウム 75mg/body day1-21 (3回/日：21日分)			

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のがいがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- 高血圧 …… 血圧が上昇する可能性があるため家庭血圧を記録する。(ペバシズマブ)
- タンパク尿 …… 定期的に尿検査を行う。(ペバシズマブ)
- 鼻血 …… 強く鼻をかんだり触ったりしない。鼻血はほとんどの場合は軽度で、安静にしていれば止まる。(ペバシズマブ)