

| | | 1病日 | 15病日 | 21病日 |
|------|------|--|------------|------|
| 休業完了 | 休業完了 | | | 休業完了 |
| 文書作成 | 文書 | 休業完了21日目 | CAP休業 | |
| | | 外 166 大腸癌・直腸癌 XELIRI/BevBS | | |
| | | がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書 | | |
| | | カベシタピン:14日分 (day1夕~day15朝) 1日2回 朝夕食後 800mg/m ² /回 | | |
| | | ※UGT1A1遺伝子多型(ホモ接合体orダブルヘテロ接合体)を有する場合のCPT-11開始量は150mg/m ² | | |
| 注射 | 抗がん剤 | 実施確認:未 ワンショット中心静脈 補助1側管1 大塚生食注 20mL 1A 1日1回 ポート針、刺入時間通確認 ---① | | |
| | | 実施確認:未 中心静脈 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 血管確保用 ---② | | |
| | | 実施確認:未 中心静脈 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 5mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 1A 1日1回 点滴速度 212ml/h 注入時間 30分 ★アプレビタント125mg服用確認★ ---③ | | |
| | | 実施確認:未 中心静脈 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 ペバシズマブ注 7.5mg/kg 1日1回 注入時間 1時間30分 ★初回90分、2回目60分、 それ以降30分に変更可能 ---④ | | |
| | | 実施確認:未 中心静脈 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 イリノテカン点滴静注 200mg/m ² 1日1回 注入時間 1時間30分 ---⑤ | | |
| | | 実施確認:未 中心静脈 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 フラッシュ用 ---⑥ | | |
| | | 実施確認:未 ワンショット中心静脈 メイン 側管1 大塚生食注 20mL 1A 1日1回 CVポート、セブタム洗浄用 ---⑦ | | |
| | 一般注射 | | | |
| 処方 | 処方 | アプレビタントカプセルセット 1セット 1日1回、1回1CP (3日間) | | |
| | | カベシタピン:14日分 体表面積参照にて処方 | カベシタピン休業開始 | |

副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅でも過ごす時も手洗いうがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- 高血圧 …… 血圧が上昇する可能性があるため家庭血圧を記録する。(ペバシズマブ)
- タンパク尿 …… 定期的に尿検査を行う。(ペバシズマブ)
- 鼻血 …… 強く鼻をかんだり触ったりしない。鼻血はほとんどの場合は軽度で、安静にしていれば止まる。(ペバシズマブ)
- 手足症候群 …… 予防のために保湿剤を1日2回以上の塗布を行う。市販のハンドクリームや保湿剤でも可。(カベシタピン)