

| | | 1病日 | 21病日 |
|------|------|--|------|
| 休業完了 | 休業完了 | | 休業完了 |
| 文書作成 | 文書 | <p>休薬完了21日目</p> <p>外 173 乳癌 DS-8201a</p> <p>がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書</p> | |
| 注射 | 抗がん剤 | <p>実施確認：未</p> <p>点滴末梢 メイン</p> <p>グラニセトロン点滴静注バッグ3mg 1袋</p> <p>デキサメタゾン注射液3. 3mg 1mL 2A</p> <p>1日1回</p> <p>点滴速度 204ml/h</p> <p>注入時間 30分</p> <p>---①</p> <p>★バル輸液セット使用★</p> <p>☆ルートは遮光不要☆</p> | |
| | | <p>実施確認：未</p> <p>点滴末梢 メイン</p> <p>大塚糖液5% 100mL 1瓶</p> <p>1日1回</p> <p>点滴速度 400ml/h</p> <p>注入時間 15分</p> <p>---②</p> <p>★バル輸液セット使用★</p> | |
| | | <p>実施確認：未</p> <p>点滴末梢 メイン</p> <p>大塚糖液5% 100mL 1瓶</p> <p>トラスツズマブ デルクステカン点滴静注用 5.4mg/kg</p> <p>注射用水PL「フソー」 20mL 1A</p> <p>1日1回</p> <p>注入時間 1時間30分</p> <p>前回異常なければ、30分まで短縮可</p> <p>---③</p> <p>↓</p> <p>★バル輸液セット使用★</p> <p>★★点滴バックを遮光すること★★</p> <p>☆ルートは遮光不要☆</p> | |
| | | <p>実施確認：未</p> <p>点滴末梢 メイン</p> <p>大塚糖液5% 100mL 1瓶</p> <p>1日1回</p> <p>点滴速度 500ml/h</p> <p>注入時間 12分</p> <p>---④</p> | |

発熱、悪寒(インフュージョンリアクション)……………点滴中～投与後24時間以内に発現する。(トラスツズマブ デルクステカン)

心機能低下 …………… 繰り返し点滴することにより労作時の呼吸困難、下肢浮腫、急激な体重増加などの症状が現れることがあるため、定期的に心エコー検査などを行う。(トラスツズマブ デルクステカン)

間質性肺疾患 …………… 息切れ、息苦しさ、空咳、発熱の症状が現れた場合、速やかに病院に連絡する。(トラスツズマブ デルクステカン)