

休薬完了	休薬完了	1病日	14病日
			休薬完了
文書作成	文書	<p>休薬完了14日目 内 177 Nivo単剤(非小細胞癌) 240mg_body がん免疫療法の副作用についての説明書・同意書 ※体重30kg未満の場合には全量100mLに調製</p>	
注射	抗がん剤	<p>実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 ライン確保用 ★パル輸液セット使用★ ---①</p> <p>実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 ニボルマブ点滴静注 240mg 1日1回 注入時間 30分 ★パル輸液セット使用★ ---②</p> <p>実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 ★投与後、1時間は観察を十分に… ---③</p>	
	一般注射		

□免疫チェックポイント阻害薬の有害事象への対応

- 間質性肺疾患 息切れ、息苦しさ、空咳、発熱の症状が現れた場合、速やかに病院に連絡する。
- 大腸炎 腹痛を伴う粘液便、血便が現れた場合、速やかに病院に連絡する。
- 1型糖尿病 口や喉が渴き、水分摂取が普段より多い、尿量が普段より多い場合は速やかに病院に連絡する。
- 神経障害 手足に力が入らない、食べ物が飲み込みにくい場合は速やかに病院に連絡する。
- 皮膚障害 体に発疹が出ることがあるが、ひどい口内炎、まぶたや眼の充血を伴う場合は速やかに病院に連絡する。
- 内分泌障害 倦怠感が発現することがある。