

		1病日	2病日	15病日	21病日
休薬完了	休薬完了				休薬完了
文書作成	文書	休薬完了21日目 外 189 胃癌 Nivo+G-SOX がん化学・免疫療法の副作用についての説明書・同意書 エスワン 14日分 体表面積で変更		エスワン休薬	
注射	抗がん剤	実施確認：未 ワンショット中心静脈 補助1側管1 大塚生食注 20mL 1A 1日1回 ポート針、刺入時間通確認！ ---①			
		実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 ★バル輸液セット使用★ 血管確保用 ---②			
		実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 パロメセトロン静注0.75mg 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 3A 1日1回 点滴速度 216ml/h 注入時間 30分 ★バル輸液セット使用★ ---③			
		実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 ニボルマブ点滴静注 360mg 1日1回 注入時間 30分 ★バル輸液セット使用★ ---④			
		実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 注入時間 30分 ---⑤			
		実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚糖液5%250mL 1袋 オキサリプラチン注 100mg/m <sup>2</sup> 1日1回 注入時間 2時間 ---⑥			
		実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 フラッシュ用 ---⑦			
		実施確認：未 ワンショット中心静脈 メイン 側管1 大塚生食注 20mL 1A 1日1回 CVポート、セプタム洗浄用 ---⑧			
	一般注射				
処方	処方		デキサメタゾン錠4mg 2錠 ファモチジンD錠20mg 2錠 1日2回 朝食後、16時 2日分		
		エスワン:14日分 体表面積参照にて処方		エスワン休薬開始	

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなるがあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなることがあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅でも手洗いうがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- 末梢神経障害 …… 冷感刺激を避けること(特に点滴後5日間程度)。治療を繰り返すことにより手足がしびれることがある。(オキサリプラチン)
- アレルギー反応 …… 治療を繰り返すことによりアレルギー反応を起すことがある。(オキサリプラチン)
- 流涙 …… 防腐剤を含まない人工涙液を5~8回/日点眼する。(エスワン)
- 手足症候群 …… 予防のために保湿剤を1日2回以上塗布。市販のハンドクリームや保湿剤でも可。(エスワン)

□免疫チェックポイント阻害薬の有害事象への対応

- 間質性肺疾患 …… 息切れ、息苦しさ、空咳、発熱の症状が現れた場合、速やかに病院に連絡する。
- 大腸炎 …… 腹痛を伴う粘液便、血便が現れた場合、速やかに病院に連絡する。
- 1型糖尿病 …… 口や喉が渇き、水分摂取が普段より多い、尿量が普段より多い場合は速やかに病院に連絡する。
- 神経障害 …… 手足に力が入らない、食べ物が飲み込みにくい場合は速やかに病院に連絡する。
- 皮膚障害 …… 体に発疹が出るがあるが、ひどい口内炎、まぶたや眼の充血を伴う場合は速やかに病院に連絡する。
- 内分泌障害 …… 倦怠感が発現することがある。