

		1歳日	8歳日	9歳日	15歳日	16歳日	22歳日	23歳日	28歳日
休薬完了	休薬完了								休薬完了
文書作成	文書	休薬完了28日目 外 19 胃癌 S-1+CDDP がん薬物療法副作用についての説明書・同意書 S-1(Day1-21)体表面積にて処方					S-1休薬		
注射	抗がん剤	実施確認：未 点滴末梢 メイン ラクテックG輸液 500mL 1袋 1日1回 点滴速度 250ml/h 注入時間 2時間 ---①			実施確認：未 点滴末梢 メイン ラクテックG輸液 500mL 1袋 1日1回 点滴速度 250ml/h 注入時間 2時間 ---①			実施確認：未 点滴末梢 メイン ラクテックG輸液 500mL 1袋 1日1回 点滴速度 250ml/h 注入時間 2時間 ---①	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 5mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 214ml/h 注入時間 30分 ---② ★アプレビタント125mg服用確認★			実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 5mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 214ml/h 注入時間 30分 ---② ★アプレビタント125mg服用確認★			実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 5mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 214ml/h 注入時間 30分 ---② ★アプレビタント125mg服用確認★	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 90mL シスプラチン注 30mg 1日1回 注入時間 30分 ---③			実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 90mL シスプラチン注 30mg 1日1回 注入時間 30分 ---③			実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 90mL シスプラチン注 30mg 1日1回 注入時間 30分 ---③	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン ラクテックG輸液 500mL 1袋 1日1回 点滴速度 250ml/h 注入時間 2時間 ---④			実施確認：未 点滴末梢 メイン ラクテックG輸液 500mL 1袋 1日1回 点滴速度 250ml/h 注入時間 2時間 ---④			実施確認：未 点滴末梢 メイン ラクテックG輸液 500mL 1袋 1日1回 点滴速度 250ml/h 注入時間 2時間 ---④	
一般注射									
処方	処方	S-1(Day1-21)体表面積にて処方	アプレビタントカプセルセット 1㊦ 1日1回、1回1錠 1日目、125mgを使用 2日目で降、80mgを午前中に服用	デキサメタゾン錠4mg 2錠 1日2回 朝食後、16時 2日分 抗がん剤翌日より内服	アプレビタントカプセルセット 1㊦ 1日1回、1回1錠 1日目、125mgを使用 2日目で降、80mgを午前中に服用	デキサメタゾン錠4mg 2錠 1日2回 朝食後、16時 2日分 抗がん剤翌日より内服	アプレビタントカプセルセット 1㊦ 1日1回、1回1錠 1日目、125mgを使用 2日目で降、80mgを午前中に服用	デキサメタゾン錠4mg 2錠 1日2回 朝食後、16時 2日分 抗がん剤翌日より内服	

副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるものを、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便がゆるくなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅でも手洗いうがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- 腎機能障害 …… 予防のために点滴当日から3日間は1Lの飲水を中心がけてください。(シスプラチン)
- アレルギー反応 …… 治療を繰り返すことによりアレルギー反応を起こすことがある。(シスプラチン)
- 涙 …… 防腐剤を含まない人工涙液を5-6回/日点眼する。(S-1)
- 手足症候群 …… 予防のために保湿剤を1日2回以上塗布。市販のハンドクリームや保湿剤でも可。(S-1)