

		1病日	2病日	15病日	21病日
休薬完了	休薬完了				休薬完了
文書作成	文書	休薬完了21日目			
		外 190 胃癌 Nivo+G-XELOX がん化学・免疫療法の副作用についての説明書・同意書 カベンタピン処方 14日分 体表面積で変更			
注射	抗がん剤	実施確認：未 ワンショット中心静脈 補助1側管1 大塚生食注 20mL 1A 1日1回 ポート針、刺入時間通確認 ---①			
		実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 ★バル輸液セット使用★ ルート確保用 ---②			
		実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 3A 1日1回 点滴速度 216ml/h 注入時間 30分 ★バル輸液セット使用★ ---③			
		実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 ニボルマブ点滴静注 360mg 1日1回 注入時間 30分 ★バル輸液セット使用★ ---④			
		実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 注入時間 30分 ---⑤			
		実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚糖液5%250mL 1袋 オキサリプラチン注 130mg/m ² 1日1回 注入時間 2時間 ---⑥			
		実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 フラッシュ用 ---⑦			
		実施確認：未 ワンショット中心静脈 メイン 側管1 大塚生食注 20mL 1A 1日1回 CVポート、セブタム洗浄用 ---⑧			
	一般注射				
処方	処方		デキサメタゾン錠4mg 2錠 ファモチジンD錠20mg 2錠 1日2回 朝食後、16時 2日分		
		カベンタピン:14日分 体表面積参照にて処方		カベンタピン休薬開始	

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなるがあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなることがあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- 末梢神経障害 …… 冷感刺激を避けること(特に点滴後5日間程度)。治療を繰り返すことにより手足がしびれることがある。痛みを伴う場合は痛み止めを使うことがある。(オキサリプラチン)
- アレルギー反応 …… 治療を繰り返すことによりアレルギー反応を起こすことがある。(オキサリプラチン)
- 手足症候群 …… 予防のために保湿剤を1日2回以上の塗布を行う。市販のハンドクリームや保湿剤でも可。(カベンタピン)

□免疫チェックポイント阻害薬の有害事象への対応

- 間質性肺疾患 …… 息切れ、息苦しさ、空咳、発熱の症状が現れた場合、速やかに病院に連絡する。
- 大腸炎 …… 腹痛を伴う粘液便、血便が現れた場合、速やかに病院に連絡する。
- 1型糖尿病 …… 口や喉が渇き、水分摂取が普段より多い、尿量が普段より多い場合は速やかに病院に連絡する。
- 神経障害 …… 手足に力が入らない、食べ物が飲み込みにくい場合は速やかに病院に連絡する。
- 皮膚障害 …… 体に発疹が出ることもあるが、ひどい口内炎、まぶたや眼の充血を伴う場合は速やかに病院に連絡する。
- 内分泌障害 …… 倦怠感が発現することがある。