

		1病日	21病日
休薬完了	休薬完了		休薬完了
文書作成	文書	休薬完了21日目	
		内 199 非小細胞肺癌 Pembro単剤	
		がん免疫療法の副作用についての説明書・同意書	
注射	抗がん剤	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 ライン確保用 ★バル輸液セット使用★ ――①	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 ペムプロリズマブ点滴静注 200mg 1日1回 注入時間 30分 ★バル輸液セット使用★ ――②	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 ★投与後、1時間は観察を十分に… ――③	
	一般注射		

□免疫チェックポイント阻害薬の有害事象への対応

間質性肺疾患 …………… 息切れ、息苦しさ、空咳、発熱の症状が現れた場合、速やかに病院に連絡する。

大腸炎 …………… 腹痛を伴う粘液便、血便が現れた場合、速やかに病院に連絡する。

1型糖尿病 …………… 口や喉が渇き、水分摂取が普段より多い、尿量が普段より多い場合は速やかに病院に連絡する。

神経障害 …………… 手足に力が入らない、食べ物が飲み込みにくい場合は速やかに病院に連絡する。

皮膚障害 …………… 体に発疹が出ることがあるが、ひどい口内炎、まぶたや眼の充血を伴う場合は速やかに病院に連絡する。

内分泌障害 …………… 倦怠感が発現することがある。