

		1病日	2病日	3病日	14病日
休薬完了	休薬完了				休薬完了
文書作成	文書	休薬完了14日目			
		外 200 大腸癌 mFOLFOXIR+BeVBS			
		がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書			
注射	抗がん剤	実施確認：未・ ワンショット中心静脈 補助1側管1 大塚生食注 20mL 1A 1日1回 ポート針、刺入時間確認！ ---①			
		実施確認：未・ 中心静脈 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 ルート確保用 ---②			
		実施確認：未・ 点滴中心静脈 メイン 側管1 大塚生食注 100mL 1瓶 ハロノセトロン静注0.75mg 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 3A ホスネツピタント静注235mg 1瓶 1日1回 点滴速度 236ml/h 注入時間 30分 ---③ ルートは後でレボホリナート投与に使用			
		実施確認：未・ 中心静脈（埋込型カテーテル使用） 大塚生食注 100mL 1瓶 ペバシズマブ注 5mg/kg 1日1回 注入時間 1時間30分 ★初回90分、2回目60分、 それ以降30分に変更可能 ---④			
		実施確認：未・ 中心静脈 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 イリノテカン点滴静注 150mg/m <sup>2</sup> 1日1回 注入時間 1時間 ---⑤			
		実施確認：未・ 中心静脈 メイン 大塚糖液5%250mL 1袋 オキサリプラチン注 85mg/m <sup>2</sup> 1日1回 注入時間 2時間 レボホリナートと同時に投与 ---⑥			
		実施確認：未・ 点滴中心静脈 メイン 側管1 大塚糖液5%250mL 1袋 レボホリナート点滴静注用 200mg/m <sup>2</sup> 1日1回 注入時間 2時間 オキサリプラチンと同時に投与 ---⑦			
		実施確認：未・ 中心静脈 メイン 大塚生食注 20mL 20mL フルオロウラシル注 2400mg/m <sup>2</sup> 1日1回 注入時間 48時間 ---⑧ インフューザーポンプ ★5-FU投与量別希釈表参照★			
		携帯ポンプ			
	一般注射			ワンショット中心静脈 補助1側管1 大塚生食注 20mL 1A	
処方	処方		デキサメタゾン錠4mg 2錠 1日2回 朝食後、16時 抗がん剤翌日より内服	⇒	

副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- 高血圧 …… 血圧が上昇する可能性があるため家庭血圧を記録する。(ペバシズマブ)
- タンパク尿 …… 定期的に尿検査を行う。(ペバシズマブ)
- 鼻血 …… 強く鼻をかんだり触ったりしない。鼻血はほとんどの場合は軽度で、安静にしていれば止まる。(ペバシズマブ)
- 末梢神経障害 …… 冷感刺激を避けること(特に点滴後5日間程度)。治療を繰り返すことによって手足がしびれることがある。痛みを伴う場合は痛み止めを使うことがある。(オキサリプラチン)
- アレルギー反応 …… 治療を繰り返すことによってアレルギー反応を起こすことがある。(オキサリプラチン)