

		1病日	21病日
休業完了	休業完了		
文書作成	文書	休業完了21日目 内 227 非小細胞肺癌 CBDCA/PTX/Bev/Atezo がん化学・免疫療法の副作用についての説明書・同意書 アルコール過敏症確認	
注射	抗がん剤	実施確認：未 持続末梢インフュージョン 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 5mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 5A ファモチジン注射液20mg 2mL 1A 1日1回 点滴速度 224ml/h 注入時間 30分 ---① ↓ ↓ ↓ ★バル輸液セット使用★ ★ジフェンヒドラミン・77レクタ125mg内服確認	
		実施確認：未 持続末梢インフュージョン 大塚生食注 250mL 1袋 アテゾリズマブ点滴静注 1200mg 1日1回 注入時間 1時間 ★バル輸液セット使用★ ★前回、異常なければ30分に短縮可 ---②	
		実施確認：未 持続末梢インフュージョン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 ★バル輸液セット使用★ ---③	
		実施確認：未 持続末梢インフュージョン テルモ生食 500mL 1袋 パクリタキセル注 200mg/m ² 1日1回 注入時間 3時間 ★バル輸液セット使用★ ---④	
		実施確認：未 持続末梢インフュージョン 大塚生食注 250mL 1袋 カルボプラチン点滴静注液 AUC=6 1日1回 注入時間 1時間 ---⑤	
		実施確認：未 持続末梢インフュージョン 大塚生食注 100mL 1瓶 ペバシズマブ点滴静注用 15mg/kg 1日1回 注入時間 1時間30分 ★初回90分、2回目60分、 それ以降30分に変更可能 ---⑥	
		実施確認：未 持続末梢インフュージョン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ---⑦	
	一般注射		
処方	処方	アプレピタントカプセルセット 1セット 1日1回、1回1錠 1日目、125mgを使用 2日目以降、80mgを午前中に服用	
		ジフェンヒドラミン錠 10mg 5錠 1日1回 点滴①の開始前に内服	

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のがいがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅でも過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- 高血圧 …… 血圧が上昇する可能性があるため家庭血圧を記録する。(ペバシズマブ)
- タンパク尿 …… 定期的に尿検査を行う。(ペバシズマブ)
- 鼻血 …… 強く鼻をかんだり触ったりしない。鼻血はほとんどの場合は軽度で、安静にしていれば止まる。(ペバシズマブ)
- アレルギー反応 …… 治療を繰り返すことによってアレルギー反応を起こすことがある。(カルボプラチン)

□免疫チェックポイント阻害薬の有害事象への対応

- 間質性肺疾患 …… 息切れ、息苦しさ、空咳、発熱の症状が現れた場合、速やかに病院に連絡する。
- 大腸炎 …… 腹痛を伴う粘液便、血便が現れた場合、速やかに病院に連絡する。
- 1型糖尿病 …… 口や喉が渇き、水分摂取が普段より多い、尿量が普段より多い場合は速やかに病院に連絡する。
- 神経障害 …… 手足に力が入らない、食べ物が飲み込みにくい場合は速やかに病院に連絡する。
- 皮膚障害 …… 体に発疹が出ることもあるが、ひどい口内炎、まぶたや眼の充血を伴う場合は速やかに病院に連絡する。
- 内分泌障害 …… 倦怠感が発現することがある。