

		1病日	14病日
休業完了	休業完了		休業完了
文書作成	文書	休業完了14日目	
		投与期間は最長12ヶ月間まで	
		内 215 Durvalumab単剤(非小細胞肺癌)	
		がん免疫療法の副作用についての説明書・同意書	
注射	抗がん剤	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 ライン確保用 ★パル輸液セット使用★ ――①	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 デュルバルマブ点滴静注 10mg/kg 1日1回 注入時間 1時間 ★パル輸液セット使用★ ――②	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 ★投与後、1時間は観察を十分に… ――③	
	一般注射		

□免疫チェックポイント阻害薬の有害事象への対応

間質性肺疾患 …………… 息切れ、息苦しさ、空咳、発熱の症状が現れた場合、速やかに病院に連絡する。

大腸炎 …………… 腹痛を伴う粘液便、血便が現れた場合、速やかに病院に連絡する。

1型糖尿病 …………… 口や喉が渇き、水分摂取が普段より多い、尿量が普段より多い場合は速やかに病院に連絡する。

神経障害 …………… 手足に力が入らない、食べ物が飲み込みにくい場合は速やかに病院に連絡する。

皮膚障害 …………… 体に発疹が出ることもあるが、ひどい口内炎、まぶたや眼の充血を伴う場合は速やかに病院に連絡する。

内分泌障害 …………… 倦怠感が発現することがある。