

		1病日	22病日	42病日
休薬完了	休薬完了			休薬完了
文書作成	文書	休薬完了42日目		
		内 268 Nivo+PI(非小細胞癌)		
		がん免疫療法の副作用についての説明書・同意書		
		※体重30kg未満の場合、Nivolは全量100mLに調製		
注射	抗がん剤	実施確認：未 持続末梢マイグソ® 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 ライン確保用 ★バル輸液セット使用★ ---①	実施確認：未 持続末梢マイグソ® 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 ライン確保用 ★バル輸液セット使用★ ---①	
		実施確認：未 持続末梢マイグソ® 大塚生食注 100mL 1瓶 ニボルマブ点滴静注 360mg 1日1回 注入時間 30分 ★バル輸液セット使用★ ---②	実施確認：未 持続末梢マイグソ® 大塚生食注 100mL 1瓶 ニボルマブ点滴静注 360mg 1日1回 注入時間 30分 ★バル輸液セット使用★ ---②	
		実施確認：未 持続末梢マイグソ® 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 ★バル輸液セット使用★ ---③	実施確認：未 持続末梢マイグソ® 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 ★投与後、1時間は観察を十分に… ---③	
		実施確認：未 持続末梢マイグソ® 大塚生食注 50mL 30mL イピリムマブ点滴静注液 1mg/kg 1日1回 注入時間 30分 ★バル輸液セット使用★ ---④		
		実施確認：未 持続末梢マイグソ® 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 ★投与後、1時間は観察を十分に… ---⑤		

□免疫チェックポイント阻害薬の有害事象への対応

- 間質性肺疾患 …………… 息切れ、息苦しさ、空咳、発熱の症状が現れた場合、速やかに病院に連絡する。
- 大腸炎 …………… 腹痛を伴う粘液便、血便が現れた場合、速やかに病院に連絡する。
- 1型糖尿病 …………… 口や喉が渇き、水分摂取が普段より多い、尿量が普段より多い場合は速やかに病院に連絡する。
- 神経障害 …………… 手足に力が入らない、食べ物が飲み込みにくい場合は速やかに病院に連絡する。
- 皮膚障害 …………… 体に発疹が出ることもあるが、ひどい口内炎、まぶたや眼の充血を伴う場合は速やかに病院に連絡する。
- 内分泌障害 …………… 倦怠感が発現することがある。