

		1療日	2療日	21療日
休業完了	休業完了			
文書作成	文書	休業完了21日目	★ファシール輸液セット使用★	
		内 52 非ホジキンリンパ腫 R-CHOP療法 ※リツキシマブ		
		がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書		
		リツキシマブ投与30分前:抗ヒスタミン剤・解熱鎮痛剤服用		
注射	抗がん剤	実施確認:未 持続末梢(イボ)シブ 大塚生食注 100mL 1瓶 ヒドロコルチゾン注100mg 1瓶 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 ---① ★内服前投薬あり★	実施確認:未 持続末梢(イボ)シブ グラネトロン点滴静注3mg/100ml 1袋 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 ★ファシール輸液セット使用★ ★留置針はそのまま輸液セット交換 ---①	
		実施確認:未 持続末梢(イボ)シブ テルモ生食 500mL 1袋 リツキシマブ点滴静注 375mg/m ² 1日1回 ★翌日11時に終了★ ---②	実施確認:未 持続末梢(イボ)シブ 大塚生食注 100mL 1瓶 ピンクリステン注 1.4mg/m ² 1日1回 注入時間 30分 ★ファシール・スバ イボト使用★ ★投与側の腕を温める ---②	
			実施確認:未 持続末梢(イボ)シブ 大塚生食注 100mL 1瓶 ドキシソルピジン注 50mg/m ² 1日1回 注入時間 30分 ★ファシール・スバ イボト使用★ ★投与側の腕を温める ---③	
			実施確認:未 持続末梢(イボ)シブ テルモ生食 500mL 1袋 シクロホスファミド注 750mg/m ² 1日1回 注入時間 2時間 ★ファシール・スバ イボト使用★ ---④	
			実施確認:未 持続末梢(イボ)シブ 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ★ファシール・スバ イボト使用★ ---⑤	
	一般注射			
処方	処方		プレドニゾン錠 5mg 60mg/m ² 1日3回 朝・昼・夕食後 5日分	

□副作用への対応

悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。

便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。

下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。

口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。

好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅でも過ごす時も手洗いうがいを頻回に行う。

脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。

好中球、リンパ球減少 …… ヘルペスウイルス感染、帯状疱疹、ニューモシスチス肺炎、サイトメガロウイルス感染などの日和見感染のリスクがあるため、予防薬が処方されることがある。感染症予防のために、手洗いうがいを頻回(8回/日以上)に行う。

心機能障害 …… 投与後数週間～数ヶ月の間に、頻脈(ドキドキする)・息切れ・浮腫がでる等の症状があらわれることがある。(ドキシソルピジン)

尿着色 …… 投与後から数日間、尿や汗が赤色になることがある。(ドキシソルピジン)

出血性膀胱炎 …… 排尿時に痛みが出たり、残尿感等の症状があらわれることがある。(シクロホスファミド)

不眠 …… ステロイド内服の影響で、睡眠がとりにくくなる可能性がある。(プレドニン)