

		1病日	21病日
休薬完了	休薬完了		休薬完了
文書作成	文書	休薬完了21日目 婦人 58 卵巣癌 PTX/CBDCA/Bev がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書 アルコール過敏症確認	
注射	抗がん剤	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 血管確保用 ★ハル輸液セット使用★ ★アプレビタント・アプレビタント(125mg)内服確認★ ①	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 5mL 1瓶 テキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 5A ファモチジン注射液20mg 2mL 1A 1日1回 点滴速度 224ml/h 注入時間 30分 ②	
		実施確認：未 持続末梢インポンプ テルモ生食 500mL 1袋 バクリタキセル注 175mg/m ² 1日1回 注入時間 3時間 ★ハル輸液セット使用 ③	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 カルボプラチン点滴静注液 AUC=6 1日1回 注入時間 1時間 ④	
		実施確認：未 持続末梢インポンプ 大塚生食注 100mL 1瓶 ペバシズマブ点滴静注用 15mg/kg 1日1回 注入時間 1時間30分 ★初回90分、2回目60分、 それ以降30分に変更可能 ⑤	
		実施確認：未 持続末梢インポンプ 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 ⑥	
	一般注射		
処方	処方	ジフェンヒドラミン錠 10mg 5錠 1日1回	
		アプレビタントカプセルセット 1セット 1日1回、1回1錠 1日目、125mgを使用 2日目を降、80mgを午前中に服用	

□副作用への対応

悪心嘔吐、食欲不振	……	食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
便秘	……	便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
下痢	……	便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
口内炎	……	予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
好中球減少	……	感染症予防のために外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。
脱毛	……	点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
末梢神経障害	……	治療を繰り返すことによって手足がしびれることがある。(バクリタキセル)
関節痛・筋肉痛	……	点滴後、関節痛や筋肉痛を感じることもある。痛みが強い場合は鎮痛剤を使うこともある。(バクリタキセル)
アレルギー反応	……	治療を繰り返すことによってアレルギー反応を起こすことがある。(カルボプラチン)
高血圧	……	血圧が上昇する可能性があるため家庭血圧を記録する。(ペバシズマブ)
タンパク尿	……	定期的に尿検査を行う。(ペバシズマブ)
鼻血	……	強く鼻をかんだり触ったりしない。鼻血はほとんどの場合は軽度で、安静にしていれば止まる。(ペバシズマブ)