

		1病日	2病日	3病日	21病日
休薬完了	休薬完了				休薬完了
文書作成	文書	<ul style="list-style-type: none"> 休薬完了21日目 婦人 59 卵巣癌 DOC/CBDCA/Bev がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書 アプレビタント125mg内服確認 	アプレビタント80mg内服確認	アプレビタント80mg内服確認	
注射	抗がん剤	実施確認：未・ 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 血管確保用 ★アプレビタント(125mg)内服確認★ ---①			
		実施確認：未・ 持続末梢(パ) ヲ 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 5mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 224ml/h 注入時間 30分 ---②			
		実施確認：未・ 持続末梢(パ) ヲ 大塚生食注 250mL 1袋 トセタキセル点滴静注 75mg/ml 1日1回 注入時間 1時間 ---③			
		実施確認：未・ 持続末梢(パ) ヲ 大塚生食注 250mL 1袋 カルボプラチン点滴静注液 AUC=6 1日1回 注入時間 1時間 ---④			
		実施確認：未・ 持続末梢(パ) ヲ 大塚生食注 100mL 1瓶 ペバシズマブ点滴静注用 15mg/kg 1日1回 注入時間 1時間30分 ★初回90分、2回目60分、 それ以降30分に変更可能 ---⑤			
		実施確認：未・ 持続末梢(パ) ヲ 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 フラッシュ用 ---⑥			
	一般注射				
処方	処方		デキサメタゾン錠4mg 1錠 1日2回 朝食後、16時 2日分 抗がん剤翌日より内服	⇒	
		アプレビタントカプセルセット 1セット 1日1回、1回1CP (3日間) 1日目、125mgを使用 2日目を降、80mgを午前中に服用			

副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなるがあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなるがあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅でも過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- 爪の変形 …… 繰り返し点滴することにより爪の変形や変色が起こることがある。清潔に保ち、強い力をかけないようにする。(ドセタキセル)
- 浮腫 …… 繰り返し点滴することにより顔や足に浮腫が起こることがある。(ドセタキセル)
- アレルギー反応 …… 治療を繰り返すことによってアレルギー反応を起こすことがある。(カルボプラチン)
- 高血圧 …… 血圧が上昇する可能性があるため家庭血圧を記録する。(ペバシズマブ)
- タンパク尿 …… 定期的に尿検査を行う。(ペバシズマブ)
- 鼻血 …… 強く鼻をかんだり触ったりしない。鼻血はほとんどの場合は軽度で、安静にしていれば止まる。(ペバシズマブ)