

		1病日	3病日	14病日
休業完了	休業完了			休業完了
文書作成	文書	休業完了14日目 外 66 大腸癌 FOLFIRI がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書		
注射	抗がん剤	実施確認：未 ワンシヨット中心静脈 補助1側管1 大塚生食注 20mL 1A 1日1回 ポート針、刺入時開通確認 ---①		
		実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 ルート確保用 ---②		
		実施確認：未 点滴中心静脈 メイン 側管1 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 5mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 3A 1日1回 点滴速度 216ml/h 注入時間 30分 ---③ ルートは後でレボホリナート投与に使用		
		実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 イリノテカン点滴静注 150mg/ml 1日1回 注入時間 2時間 レボホリナートと同時に投与 ---④		
		実施確認：未 点滴中心静脈 メイン 側管1 大塚生食注 250mL 1袋 レボホリナート点滴静注用 200mg/ml 1日1回 注入時間 2時間 イリノテカンと同時に投与 ---⑤		
		実施確認：未 点滴中心静脈 メイン 側管1 大塚生食注 50mL 1瓶 フルオロウラシル注 400mg/ml 1日1回 注入時間 5分 急速投与 ---⑥		
		実施確認：未 中心静脈 メイン 大塚生食注 20mL 20mL フルオロウラシル注 2400mg/ml 1日1回 注入時間 46時間 ---⑦ インフューザーポンプ ★フルオロウラシル投与量別希釈表参照★		
	携帯ポンプ			
一般注射		ワンシヨット中心静脈 補助1側管1 大塚生食注 20mL 1A		

□副作用への対応
 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
 便秘 …………… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
 下痢 …………… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
 口内炎 …………… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
 好中球減少 …………… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。
 脱毛 …………… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。