

		1病日	2病日	3病日	21病日
休業完了	休業完了				休業完了
文書作成	文書	休業完了21日目			
		内 71 肺癌(小細胞癌) CBDCA/VP-16			
		がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書			
		★アルコール過敏症確認			
注射	抗がん剤	実施確認：未 持続末梢Mインボ TM 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 5mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 1A 1日1回 点滴速度 212ml/h 注入時間 30分 ---① ↓ ↓ ↓ ↓ ★アプレピタント125mg服用確認	実施確認：未 持続末梢Mインボ TM 大塚生食注 100mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 1A 1日1回 点滴速度 202ml/h 注入時間 30分 ---① ↓ ↓ ↓ ↓ ★アプレピタント80mg服用確認	実施確認：未 持続末梢Mインボ TM 大塚生食注 100mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 1A 1日1回 点滴速度 202ml/h 注入時間 30分 ---① ↓ ↓ ↓ ↓ ★アプレピタント80mg服用確認	
		実施確認：未 持続末梢Mインボ TM テルモ生食 500mL 1袋 エトポシド注 100mg/m ² 1日1回 注入時間 2時間 ---②	実施確認：未 持続末梢Mインボ TM テルモ生食 500mL 1袋 エトポシド注 100mg/m ² 1日1回 注入時間 2時間 ---②	実施確認：未 持続末梢Mインボ TM テルモ生食 500mL 1袋 エトポシド注 100mg/m ² 1日1回 注入時間 2時間 ---②	
		実施確認：未 持続末梢Mインボ TM 大塚生食注 250mL 1袋 カルボプラチン点滴静注液 AUC=6 1日1回 注入時間 1時間 ---③	実施確認：未 持続末梢Mインボ TM 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 ---③	実施確認：未 持続末梢Mインボ TM 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 ---③	
		実施確認：未 持続末梢Mインボ TM 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 ---④			
		一般注射			
	処方	処方	アプレピタントカプセルセット 1セット 1日1回、1回1錠 1日目、125mgを使用 2日目以降、80mgを午前中に服用		

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …………… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …………… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …………… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …………… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。
- 脱毛 …………… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- アレルギー反応 …………… 治療を繰り返すことによってアレルギー反応を起こすことがある。(カルボプラチン)