

		1病日	21病日
休薬完了	休薬完了		休薬完了
文書作成	文書	📄 休薬完了21日目	
		📄 がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書	
		📄 婦人科80 卵巣癌 Oraparib/Bev	
		📄 ★Oraparib処方（連日内服） 📄 Bevは本レジメン開始より最長15ヶ月（22サイクル）まで	
注射	抗がん剤	実施確認：未・ 持続末梢MIP ^o ソフ 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 血管確保用 ---①	
		実施確認：未・ 持続末梢MIP ^o ソフ 大塚生食注 100mL 1瓶 ペバシズマブ点滴静注用 15mg/kg 1日1回 注入時間 1時間30分 ★初回90分、2回目60分、 それ以降30分に変更可能 ---②	
		実施確認：未・ 持続末梢MIP ^o ソフ 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ---③	
	一般注射		

高血圧 …………… 血圧が上昇する可能性があるため家庭血圧を記録する。(ペバシズマブ)

タンパク尿 …………… 定期的に尿検査を行う。(ペバシズマブ)

鼻血 …………… 強く鼻をかんだり触ったりしない。鼻血はほとんどの場合は軽度で、安静にしていれば止まる。(ペバシズマブ)

好中球減少 …………… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。(オラパリブ)

間質性肺疾患 …………… 息切れ、息苦しさ、空咳、発熱の症状が現れた場合、速やかに病院に連絡する。(オラパリブ)