

		1病日	2病日	14病日
休業完了	休業完了			休業完了
文書作成	文書	休業完了14日目		
		外 90 結腸癌・直腸癌 CPT-11+ Cetuximab療法 (biweekl がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書		
注射	抗がん剤	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 3A d-クロルフェニラミン注5mg 0.5% 1mL 1A 1日1回 点滴速度 218ml/h 注入時間 30分 ---①		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 セツキシマブ注射液 500mg/m <sup>2</sup> 1日1回 注入時間 2時間 ---②		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 ★投与後、1時間は観察を十分に… ---③		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 イリノテカン点滴静注 150mg/m <sup>2</sup> 1日1回 注入時間 1時間30分 ---④		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 フラッシュ用 ---⑤		
		一般注射		
処方	処方	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg 2錠 1日2回 朝・夕食後	⇒	⇒
		ヘパリン類似物質クリーム0.3% 20g 2本 ぬり薬 1日2回 部位全身保湿用		
		ヒドロコルチゾン酪酸エステルクリーム0.1% 5g 1本 ぬり薬 1日2回 部位：顔		
		ジフルブレドナート軟膏0.05% 5g 1本 ぬり薬 1日2回 湿疹の所		
			デキサメタゾン錠4mg 2錠 ファモチジン錠20mg 2錠 1日2回 朝食後、16時 2日分	

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。  
便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。  
下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。  
口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。  
好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅でも過ごす時も手洗いうがいを頻回に行う。  
脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。  
皮膚乾燥 …… 治療が進むにつれて乾燥と掻痒感が強くなる可能性があるため、開始と同時に保湿剤を使用して保湿を開始する。(セツキシマブ)  
にきび様ざ瘡 …… 顔や胸部などに皮疹が出現するので、出現時には部位に応じたステロイド軟膏を保湿剤を塗布した上から塗布する。(セツキシマブ)  
電解質異常 …… 血液中のマグネシウム低下に伴って、動悸などが発現する可能性がある。(セツキシマブ)