

		1病日	2病日	3病日	4病日	21病日
休薬完了	休薬完了					休薬完了
文書作成	文書	休薬完了21日目				
		内 95 肺癌 カルセド単独療法 がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書				
注射	抗がん剤	実施確認：未・ 持続点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 ラモセトロン注0.3mg 1A デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 208ml/h 注入時間 30分 ---①	実施確認：未・ 持続点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 ラモセトロン注0.3mg 1A デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 208ml/h 注入時間 30分 ---①	実施確認：未・ 持続点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 ラモセトロン注0.3mg 1A デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 208ml/h 注入時間 30分 ---①		
		実施確認：未・ 持続点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ★①の制吐剤終了後フラッシュ ---②	実施確認：未・ 持続点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ★①の制吐剤終了後フラッシュ ---②	実施確認：未・ 持続点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ★①の制吐剤終了後フラッシュ ---②		
		実施確認：未・ 持続点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 アムルピシン注射用 45mg/m ² 1日1回 ★全開で ★投与側の腕を温める ---③	実施確認：未・ 持続点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 アムルピシン注射用 45mg/m ² 1日1回 ★全開で ★投与側の腕を温める ---③	実施確認：未・ 持続点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 アムルピシン注射用 45mg/m ² 1日1回 ★全開で ★投与側の腕を温める ---③		
		実施確認：未・ 持続点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ---④	実施確認：未・ 持続点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ---④	実施確認：未・ 持続点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 500ml/h 注入時間 6分 ---④		
	一般注射					
処方	処方				デキサメタゾン錠4mg 2錠 1日2回 朝・夕食後 2日分	

口副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなることがあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。