

		1病日	21病日
休薬完了	休薬完了		
文書作成	文書	<p>休薬完了21日目</p> <p>泌尿器科 腎癌 Pembrolizumab+Lenvatinib</p> <p>がん化学・免疫療法の副作用についての説明書・同意書</p> <p>(day1-21)レンバチニブ内服</p> <p>※レンバチニブによる手足症候群対策の保湿剤あり</p>	
注射	抗がん剤	<p>実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 ライン確保用 ★パル輸液セット使用★ ---①</p> <p>実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 ペムプロリズマブ点滴静注 200mg 1日1回 注入時間 30分 ★パル輸液セット使用★ ---②</p> <p>実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 ★投与後、1時間は観察を十分に… ---③</p>	
	一般注射		
処方	処方	<p>ヘパリン類似物質油性クリーム0.3% 25g 2本 ぬり薬 1日2回 部位手・足</p> <p>(day1-21)レンバチニブ内服</p>	

□副作用への対応

恶心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しづつでも食べる。水分を摂るようにする。

便秘 …… 便が出にくくなることがあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。

下痢 …… 便が緩くなるがあるので、排便回数や便の性状を記録する。

口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。

好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。

脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウイッグを利用する。

高血圧 …… 血圧が上昇する可能性があるため家庭血圧を記録する。(レンバチニブ)

□免疫チェックポイント阻害薬の有害事象への対応

間質性肺疾患 …… 息切れ、息苦しさ、空咳、発熱の症状が現れた場合、速やかに病院に連絡する。

大腸炎 …… 腹痛を伴う粘液便、血便が現れた場合、速やかに病院に連絡する。

1型糖尿病 …… 口や喉が渴き、水分摂取が普段より多い、尿量が普段より多い場合は速やかに病院に連絡する。

神経障害 …… 手足に力が入らない、食べ物が飲み込みにくい場合は速やかに病院に連絡する。

皮膚障害 …… 体に発疹があることがあるが、ひどい口内炎、まぶたや眼の充血を伴う場合は速やかに病院に連絡する。

内分泌障害 …… 倦怠感が発現することがある。