

		1病日	2病日	3病日	4病日	8病日	15病日	28病日
休薬完了	休薬完了							
文書作成	文書作成	休薬完了28日目	Day2~4 約90時間持続点滴	Day2~4 約90時間持続点滴	Day2~4 約90時間持続点滴	朝の採血結果で 薬剤減量する		休薬完了
		泌尿器科 UC-5 原路上皮癌 60療法 がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書						
注射	抗がん剤	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg 2mL 1A デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 250ml/h 注入時間 2時間 ---① ★アプレピタントなし	実施確認：未 点滴末梢 メイン ソルデム1輸液 500mL 1袋 1日1回 点滴速度 250ml/h 注入時間 2時間 ---①			実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg 2mL 1A デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 250ml/h 注入時間 2時間 ---①	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg 2mL 1A デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 250ml/h 注入時間 2時間 ---①	
		実施確認：未 持続末梢メイン 大塚糖液5% 100mL 1瓶 ゲムシタピン点滴静注用 1000mg/g/ml 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 ★投与前の腕を温める ---②	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 パロセチド注0.75mg 5mL 1瓶 ファモチジン注射液20mg 2mL 1A デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 3A 1日1回 点滴速度 220ml/h 注入時間 30分 ---② ★アプレピタント125mg服用確認			実施確認：未 持続末梢メイン 大塚糖液5% 100mL 1瓶 ゲムシタピン点滴静注用 1000mg/g/ml 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 ★投与前の腕を温める ---②	実施確認：未 持続末梢メイン 大塚糖液5% 100mL 1瓶 ゲムシタピン点滴静注用 1000mg/g/ml 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 ★投与前の腕を温める ---②	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 ★フラッシュ終了後、抜針 ---③	実施確認：未 持続末梢メイン テルモ生食 500mL 1袋 シスプラチン注 70mg/g/ml ★全量500mLに合わせる★ 1日1回 点滴速度 167ml/h 注入時間 3時間 ---③			実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 ★フラッシュ終了後、抜針 ---③	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 ★フラッシュ終了後、抜針 ---③	
			実施確認：未 点滴末梢 メイン ソルデム3A輸液 500mL 1袋 フロセミド注20mg 2mL 1A 1日1回 点滴速度 250ml/h 注入時間 2時間 ---④					
			実施確認：未 点滴末梢 メイン ソルデム1輸液 500mL 1袋 1日1回 点滴速度 250ml/h 注入時間 2時間 ---⑤					
		実施確認：未 点滴末梢 メイン ラクテックG輸液 1L 1袋 KCL注20mEqキット(20ml) 0.5t 1日1回 点滴速度 100ml/h 注入時間 10時間6分 ---⑥						
	一般注射			点滴末梢 メイン ソルデム3A輸液 500mL 1袋				
				点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 2A				
				点滴末梢 メイン ソルデム3A輸液 500mL 1袋 フロセミド注20mg 2mL 0.5A				
				点滴末梢 メイン ソルデム3A輸液 500mL 1袋				
				点滴末梢 メイン ラクテックG輸液 1L 1袋				
					点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 2A			
					点滴末梢 メイン ソルデム3A輸液 500mL 1袋 フロセミド注20mg 2mL 0.5A			
処方	処方	アプレピタントカプセル125mg 1CP 1日1回 シスプラチンの投与日、点滴②の開始前に服用		アプレピタントカプセル80mg 1CP 1日1回 午前中 シスプラチンの翌日と翌々日に服用		アプレピタントカプセル80mg 1CP 1日1回 午前中 シスプラチンの翌日と翌々日に服用		

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …………… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …………… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …………… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …………… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅でも過ごす時も手洗いうがいを頻回に行う。
- 脱毛 …………… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- 腎機能障害 …………… 予防のために点滴当日から3日間は1L/日の飲水を心がけてください。(シスプラチン)
- アレルギー反応 …………… 治療を繰り返すことによりアレルギー反応を起こすことがある。(シスプラチン)